

岩手県感染症週報

平成30年第52週(12月24日～12月30日)







岩手県感染症情報センター

第52週の概要

- 1 類感染症 ・患者発生の報告はありませんでした。
- 2 類感染症 ・結核の報告が6例ありました。そのうち3例が潜在性結核感染症の報告でした。
- 3 類感染症 ・患者発生の報告はありませんでした。
- 4 類感染症 ・レジオネラ症の報告が盛岡市から1例ありました。患者は40歳代の男性です。
- 5 類感染症 (全数把握対象疾患)
 - ・カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症の報告が盛岡市から1例ありました。患者は70歳代の男性です。
 - ・侵襲性肺炎球菌感染症の報告が中部地区から1例ありました。患者は90歳代の女性です。
 - ・百日咳の報告が中部地区から1例ありました。患者は7歳の男性です。
 - ・風しんは、関東地方を中心に流行しています。本疾患はワクチンによって予防可能です。ワクチン接種を希望される方は医療機関にご相談ください。
- 5 類感染症 (定点把握対象疾患)
 - ・インフルエンザは、県内すべての地区で報告数が増加し、大船渡地区では注意報値(定点あたり患者数10人)を超えました。症状がある場合は早めの受診が勧められます。こまめな手洗いやワクチン接種、体調管理による予防と咳エチケット(咳をする際にマスクやハンカチなどで鼻や口を覆う)による感染拡大の防止が重要です。
 - ・感染性胃腸炎は、中部および大船渡地区でノロウイルスによる集団発生事例の報告がありました。ノロウイルスは感染力が強く、少ないウイルス量で感染するので注意が必要です。予防には、石けんと流水による十分な手洗いと、患者の吐物や便を使い捨ての手袋やマスクを着用して塩素系薬剤で処理することが重要です。
 - ・海外へ渡航し、帰国後に体調が悪くなった場合は、受診の際に渡航歴を伝えることが重要です。

最近の注目疾患 (定点あたり患者数の過去5週の動き)

(疾患によって目盛りのスケールが違うことに注意)



定点把握対象疾患 (過去5週の動き)

報告週対応表 <http://www.nih.go.jp/niid/ja/calendar.html>

※2018年1月1日より百日咳が5類感染症 (定点把握疾患) から5類感染症 (全数把握疾患) へ変更されました。
 ※2013年第42週より感染性胃腸炎 (ロタウイルス) が定点把握対象疾患となりました。

(定点あたり患者数)

疾病名	地域	週					流行傾向	
		48	49	50	51	52		
インフルエンザ	岩手県	0.22	0.45	1.45	2.81	4.97	↗	☆
	全国	0.93	1.7	3.35	8.05	11.17		
RSウイルス感染症	岩手県	1.03	1.28	0.82	0.67	0.64	→	☆
	全国	0.5	0.51	0.54	0.55	0.55		
咽頭結膜熱	岩手県	1.63	1.13	1.46	1.51	1.21	→	☆☆
	全国	0.66	0.66	0.73	0.7	0.57		
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	岩手県	2.93	3.67	4.13	4.03	2.67	↘	☆
	全国	2.77	3.07	2.96	3.25	2.2		
感染性胃腸炎	岩手県	3.68	4.18	4.92	4.9	3.26	↘	☆
	全国	7.89	8.86	9.24	10.1	7.58		
水痘	岩手県	0.6	0.38	0.85	0.82	0.97	→	☆☆
	全国	0.61	0.6	0.63	0.74	0.54		
手足口病	岩手県	1.78	1.9	1.69	1.64	1.18	→	☆☆
	全国	0.63	0.62	0.61	0.5	0.32		
伝染性紅斑	岩手県	2.03	1.92	1.87	2.05	1.59	→	☆☆☆
	全国	0.87	0.96	0.88	0.92	0.7		
突発性発疹	岩手県	0.3	0.31	0.44	0.36	0.28	→	☆
	全国	0.44	0.42	0.39	0.38	0.31		
ヘルパンギーナ	岩手県	0.25	0.05	0.1	0.03	0.08	→	
	全国	0.11	0.11	0.09	0.06	0.04		
流行性耳下腺炎	岩手県	0.43	0.74	0.79	0.87	0.82	→	☆☆
	全国	0.13	0.13	0.12	0.12	0.1		
急性出血性結膜炎	岩手県	0	0	0	0.07	0	→	
	全国	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02		
流行性角結膜炎	岩手県	0.86	1.14	0.71	0.71	0.43	→	☆
	全国	0.93	0.94	0.95	0.98	0.81		
細菌性髄膜炎	岩手県	0	0	0	0	0	→	
	全国	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02		
無菌性髄膜炎	岩手県	0	0	0	0.05	0	→	
	全国	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02		
マイコプラズマ肺炎	岩手県	0.63	0.37	0.16	0.37	0.32	→	☆
	全国	0.44	0.37	0.3	0.36	0.33		
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	岩手県	0	0	0	0	0	→	
	全国	0.01	0.01	-	0	0		
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	岩手県	0	0	0	0	0.05	→	
	全国	0.04	0.04	0.04	0.06	0.05		
インフルエンザ (入院患者) ※報告数であることに注意	岩手県	0	1	3	5	9	→	
	全国	62	88	149	356	539		

【流行傾向の見方】

- 無印 : ほとんど患者が発生していません
- ☆ : 患者が発生しています
- ☆☆ : 警報値を超えた地区が1～2地区あります
- ☆☆☆ : 多くの地区で警報値を超えています

全数把握対象疾患 (過去5週の動き)

※ジカウイルス感染症が2016年2月15日から四類感染症に追加されました。

(患者発生数)

分類	疾病名	(週)					累計	全国	
		48	49	50	51	52		52	累計
一類 感染症	エボラ出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリミア・コンゴ出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	痘そう	0	0	0	0	0	0	0	0
	南米出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	ペスト	0	0	0	0	0	0	0	0
	マールブルグ病	0	0	0	0	0	0	0	0
	ラッサ熱	0	0	0	0	0	0	0	0
二類	急性灰白髄炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	結核 () 内は潜在性結核感染症患者再掲	2 (0)	6 (2)	5 (1)	5 (4)	6 (3)	183 (77)	376	21850
	ジフテリア	0	0	0	0	0	0	0	0
	重症呼吸器症候群	0	0	0	0	0	0	0	0
	中東呼吸器症候群 (MERS)	0	0	0	0	0	0	0	0
	鳥インフルエンザ (H5N1)	0	0	0	0	0	0	0	0
	鳥インフルエンザ (H7N9)	0	0	0	0	0	0	0	0
三類	コレラ	0	0	0	0	0	0	0	4
	細菌性赤痢	0	0	0	0	0	0	1	268
	腸管出血性大腸菌感染症	2	0	0	0	0	67	21	3844
	腸チフス	0	0	0	0	0	0	0	35
	パラチフス	0	0	0	0	0	0	0	23
四類 感染症	E型肝炎	0	0	0	0	0	4	5	442
	ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0
	A型肝炎	0	0	0	1	0	4	6	925
	エキノコックス症	0	0	0	0	0	0	0	12
	黄熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	オウム病	0	0	0	0	0	0	0	6
	オムスク出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	回帰熱	0	0	0	0	0	0	0	6
	キャサナル森林病	0	0	0	0	0	0	0	0
	Q熱	0	0	0	0	0	0	0	3
	狂犬病	0	0	0	0	0	0	0	0
	コクシジオイデス症	0	0	0	0	0	0	0	2
	サル痘	0	0	0	0	0	0	0	0
	ジカウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)	0	0	0	0	0	0	0	77
	腎症候性出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	西部ウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダニ媒介脳炎	0	0	0	0	0	0	0	1
	炭疽	0	0	0	0	0	0	0	0
	チクングニア熱	0	0	0	0	0	0	0	4
	つつが虫病	0	0	0	0	0	1	30	455
	デング熱	0	0	0	0	0	0	3	201
	東部ウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	鳥インフルエンザ (H5N1、H7N9を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0
	ニパウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本紅斑熱	0	0	0	0	0	0	1	303
	日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	ハンタウイルス肺症候群	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bウイルス病	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼻疽	0	0	0	0	0	0	0	0
	ブルセラ症	0	0	0	0	0	0	0	3
	ベネゼエラウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	ヘンドラウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	発疹チフス	0	0	0	0	0	0	0	0
ボツリヌス症	0	0	0	0	0	0	0	2	
マラリア	0	0	0	0	0	0	1	50	
野兔病	0	0	0	0	0	0	0	0	
ライム病	0	0	0	0	0	0	0	13	
リッサウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	
リフトバレー熱	0	0	0	0	0	0	0	0	
類鼻疽	0	0	0	0	0	0	0	2	
レジオネラ症	0	1	0	0	1	14	23	2130	
レプトスピラ症	0	0	0	0	0	0	0	31	
ロッキー山紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0	0	

全数把握対象疾患 (続き) (過去5週の動き)

(患者発生数)

分類	疾病名	(週)					累計	全国	
		48	49	50	51	52		52	累計
五類 感 染 症	アメーバ赤痢	0	0	0	0	0	9	14	838
	ウイルス性肝炎 (A型肝炎及びE型肝炎を除く)	0	0	0	0	0	0	3	269
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	0	0	0	0	1	11	38	2253
	急性弛緩性麻痺	0	0	0	0	0	0	1	139
	急性脳炎 (ウエストナイル脳炎及び日本脳炎を除く)	0	0	0	0	0	2	14	657
	クリプトスポリジウム症	0	0	0	0	0	0	0	25
	クロイツフェルト・ヤコブ病	0	0	0	0	0	2	3	219
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0	0	1	1	0	8	11	687
	後天性免疫不全症候群	0	0	0	0	0	3	12	1292
	ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	1	68
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	0	0	0	0	0	3	10	483
	侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	0	0	0	0	2	37
	侵襲性肺炎球菌感染症	0	0	2	0	1	19	54	3299
	水痘 (入院例)	0	0	0	0	0	5	12	461
	先天性風しん症候群	0	0	0	0	0	0	0	0
	梅毒	0	0	1	0	0	29	64	6923
	播種性クリプトコックス症	0	0	0	0	0	0	2	178
	破傷風	0	0	0	0	0	1	3	130
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	0	0	0	1	2	79
	百日咳	2	1	0	1	1	61	234	11947
風しん	0	0	0	0	0	1	84	2917	
麻しん	0	0	0	0	0	0	6	282	
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	0	0	0	1	24	

今注目の感染症

インフルエンザ

インフルエンザは、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症で、毎年世界中で流行がみられます。潜伏期間は1日～3日程で、38℃以上の発熱、頭痛、筋肉痛、関節痛などの症状が突然現れ、鼻水や咳などの呼吸器症状が続きます。

岩手県では、例年、11月下旬から12月上旬頃に発生が始まり、1月から3月頃に患者数が増加します。今シーズンは第50週に定点あたり患者数が1.45人となり、流行開始の目安である1.0人を上回りました。



主な感染経路は咳やくしゃみなどによる飛沫感染と、飛沫の付着物に触れた手指などを介した接触感染です。予防には、マスクの着用などの咳エチケットによる飛沫感染対策と、手洗いによる接触感染対策の他、ワクチン接種が効果的です。ワクチンによる予防効果が現れるまでには2週間程度かかるため、早めの接種が勧められます。接種を希望される方は事前に医療機関にお問い合わせください。

参考 インフルエンザとは (国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/219-about-flu.html>

IDWR 2018年第49号 注目すべき感染症 (国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-m/flutoppage/591-idsc/idwr-topic/8481-idwrc-1849.html>



※国土交通省国土政策局「H29年1月1日時点国土数値情報(行政区域データ)」をもとに岩手県が編集・加工した。
※この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(承認番号 平29情使、第675号)

岩手県 第52週

今注目の感染症 (つづき)

風しん

風しんは、風しんウイルスによって引き起こされる、発熱、発疹、リンパ節の腫脹を特徴とする急性の発疹性感染症です。風しんウイルスは、患者の飛沫（唾液のしぶき）などによりヒトからヒトへ感染します。潜伏期間は2週間程度で、発疹が出る前後1週間位がヒトへの感染力があるとされています。風しんに免疫を持たない妊婦が、妊娠第20週頃までに感染すると、「先天性風しん症候群」という目や心臓、耳などに障害を持つ子供が生まれる可能性があり、妊婦への感染を防止することが重要です。

全国では、2018年第30週以降、関東地方で報告数が大幅に増加し、第51週までの累積報告数が2,806人となり、全国流行があった2013年（14,344人）に次いで2番目に多い報告数となっています。男女別にみますと、男性2,280人、女性526人と男性が約4.3倍の報告数となっており、今回の流行は、風しんの抗体を保有していない30～50代の男性で感染が拡大しているとみられます。

岩手県では、全数把握疾患となった2008年以降、2018年第52週までに22人報告されています。全国流行があった2013年には9人の報告がありました。

予防にはワクチン接種が最も効果的です。2回の定期予防接種（1歳児と小学校入学前1年間）を徹底しましょう。また、妊婦への感染を防止するため、予防接種歴や抗体陽性が確認できない「妊婦の夫、子どもや同居家族」、「妊娠希望者や妊娠の可能性が高い女性」の方は、任意で予防接種を受けることが推奨されます。

参考 風疹とは（国立感染症研究所）

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/430-rubella-intro.html>

風疹急増に関する緊急情報：2018年12月26日現在（国立感染症研究所）

<https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/rubella/181226/rubella181226.pdf>

風しんについて（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/




図1 全国における風しん累積報告数の推移 (2012～2018年第51週) (国立感染症研究所HPより)




図2 全国における年齢別、男女別風しん累積報告数 (2018年第1～51週) (国立感染症研究所HPより)




図3 岩手県における年別・性別風しん報告数 (2008～2018年第52週)

今注目の感染症（つづき）

梅毒

梅毒は、感染力が強い「梅毒トレポネーマ」という、らせん状の細菌によって引き起こされます。主に、感染している人の病変部（性器、口唇部、口腔内、肛門等）と直接接触する性行為や疑似性行為により「梅毒トレポネーマ」が粘膜や皮膚などの傷口から侵入して感染します。

感染後3週間程度の潜伏期の後に、感染部位にしこりや潰瘍がみられるようになりますが、数週間程度で症状がなくなります（早期顕症Ⅰ期）。その後、治療をせずに数週間～数カ月経過すると、病原体が血液によって全身に運ばれ、手のひらや足の裏、体全体に発疹がみられるようになります（早期顕症Ⅱ期）。さらに、感染後数年～数十年経過すると、ゴムのような腫瘍、心血管症状、神経症状などが出現する場合があります（晩期顕症）。妊娠している方が梅毒に感染すると、胎盤を通して胎児に感染し、死産、早産、新生児死亡や奇形が起こることがあります。

早期顕症と晩期顕症の間には症状が消える無症候期がありますが、体内には梅毒トレポネーマが残っており、感染を広げる恐れがあります。この無症候期が診断・治療の遅れにつながるため、注意が必要です。また、終生免疫は得られないため、再感染する可能性があります。

全国では、2010年以降、報告数が増加傾向に転じています。男女の異性間性交渉での感染が増加しているほか、性風俗店利用者での梅毒の報告数が増加しています。岩手県では、例年、数例の報告でしたが、2016年に9例、2017年には16例の報告がありました。2018年は29例が報告されました。

梅毒は早期発見、早期検査、早期治療が重要です。感染が疑われる症状がみられた場合は、早めに医師の診断や治療を受けましょう。また、感染していたことがわかった場合は、周囲で感染の可能性のある方（パートナー等）と一緒に検査を行い、必要に応じて治療を行うことが重要です。

岩手県では、県内各保健所において、匿名、無料で梅毒検査を行っています。他の性感染症も含め、適切な予防対策を取り、症状がみられるなど不安がある場合には、検査や医療機関を受診するよう心がけましょう。

参考 IASR 2015年2月号（国立感染症研究所）

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/id/742-disease-based/ha/syphilis/idsc/iasr-topic/5404-tpc420-j.html>




図1 全国における梅毒患者届出数の推移（2006年～2017年）




図2 岩手県における梅毒患者届出数の推移（2006年～2018年第52週）

今注目の感染症 (つづき)

伝染性紅斑 (リンゴ病)

伝染性紅斑は、ヒトパルボウイルスB19を病原体とし、4～5歳の幼児を中心に幼児、学童に好発する流行性発疹性疾患です。頬に出現する蝶翼状の紅斑が特徴的です。両頬がリンゴのように赤くなることから「リンゴ病」と呼ばれることもあります。

頬に発疹が出現する7～10日くらい前に微熱や感冒様症状がみられることが多く、この時期はウイルス血症を起こしており、ウイルスの体外への排泄量が最も多くなります。本疾患の特徴的な症状は、10～20日の潜伏感染の後に出現する両頬の境界明瞭な紅斑で、続いて腕・脚部にも両側性に網目状・レース状の紅斑が出現します。胸腹背部にも発疹がでることがあります。

発疹が現れて伝染性紅斑と診断されたときにはウイルス血症は終息しており、ウイルスの排泄はほとんどなく感染性はほぼないといわれています。感染経路は、通常は飛沫または接触感染です。

妊婦の方が感染すると、胎児の異常(胎児水腫)および流産をおこす可能性があるため注意が必要です。


岩手県では、2018年は第26週をピークに断続的に減少していましたが、第39週ごろから報告数が増加し始めました。第47週から多くの地区で報告数が増加し、第48週では県全体で警報値(定点あたり患者数2人)を超えました。第52週は前週より報告数が減少しましたが、警報値を超えた状況が続いている地区もあるため、引き続き注意が必要です。

参考 伝染性紅斑とは (国立感染症研究所)


<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ta/5th-disease.html>

IDWR 2011年第25週 注目すべき感染症 (国立感染症研究所)


<https://idsc.niid.go.jp/idwr/douko/2011d/25douko.html#chumoku1>



岩手県 第50週




岩手県 第51週



岩手県 第52週

※国土交通省国土政策局「H29年1月1日時点国土数値情報(行政区域データ)」をもとに岩手県が編集・加工した。
※この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を使用した。(承認番号 平29情使、第675号)



病原体検出情報

- ・この週には病原体検出情報はありません。

集団感染情報

○感染性胃腸炎の集団発生について

- ・北上市内の小学校（児童216名、職員20名）
12月5日（水）から12月24日（月）にかけて、児童30名に症状（嘔吐、下痢等）
有症者6名からノロウイルスを検出
- ・陸前高田市内の介護サービス事業所（利用者22名、職員15名）
12月12日（水）から12月24日（月）にかけて、利用者9名、職員2名に症状（嘔吐、下痢等）
有症者9名からノロウイルスを検出

○インフルエンザによる学校等の休業措置について

- ・この週には情報はありませんでした。

詳細は岩手県医療政策室のホームページを御覧ください。

<http://www.pref.iwate.jp/iryuu/kenkou/Influ/69113/index.html>

医療機関からの情報

- ・この週には医療機関からの情報はありません。

Q & A

読者の皆様からのご質問にはこの欄でお答えします。

医療機関からの情報や読者の皆様からのご質問は下記の宛先までお寄せください。







岩手県感染症情報センター（岩手県環境保健研究センター保健科学部内）






〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡1-11-16







TEL:019-656-5669（直通） FAX:019-656-5667

E-mail: CC0019@pref.iwate.jp

疾病別グラフ (定点あたり患者数の推移)







定点医療機関の数

地区	定点種別	インフル エンザ	小児科定 点	眼科定点	基幹定点
岩手県		64	39	14	19
盛岡市		11	7	3	5
県央		8	5	2	0
中部		12	7	2	4
奥州		6	3	1	2
一関		7	4	1	2
大船渡		6	4	1	1
釜石		3	2	1	1
宮古		5	3	1	1
久慈		3	2	1	1
二戸		3	2	1	2



無料です!!

岩手の感染症情報を毎週メールでお届けする

「岩手県感染症情報ウィークリーマガジン」を配信しています。

配信の登録は以下のURLからお願いします。

<http://www2.pref.iwate.jp/~hp1353/kansen/mailmagazine.html>

岩手県感染症週報 平成30年第52週 平成31年1月9日発行

監修：岩手県感染症発生動向調査委員会

発行：岩手県環境保健研究センター
岩手県保健福祉部医療政策室

事務局：岩手県感染症情報センター
(岩手県環境保健研究センター保健科学部内)

〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡1-11-16

TEL:019-656-5669 (直通) FAX:019-656-5667

E-mail: CC0019@pref.iwate.jp

URL: <http://www2.pref.iwate.jp/~hp1353/kansen/>

<岩手県感染症情報センター>

<http://www.pref.iwate.jp/iryuu/kenkou/index.html>

<岩手県保健福祉部医療政策室>