

# 岩手県感染症週報

平成31年第10週(3月4日～3月10日)







岩手県感染症情報センター

## 第10週の概要

- 1 類感染症 ・ 患者発生の報告はありませんでした。
- 2 類感染症 ・ 結核の報告が3例ありました。このうち2例は潜在性結核感染症の報告でした。
- 3 類感染症 ・ 患者発生の報告はありませんでした。
- 4 類感染症 ・ 患者発生の報告はありませんでした。
- 5 類感染症 (全数把握対象疾患)
  - ・ 急性脳炎の報告が中部地区から1例ありました。患者は4歳の女性です。
  - ・ 侵襲性肺炎球菌感染症の報告が盛岡市から1例ありました。患者は70歳代の男性です。
  - ・ 百日咳の報告が一関地区から1例ありました。患者は10歳代の男性です。
- 5 類感染症 (定点把握対象疾患)
  - ・ 溶連菌咽頭炎は、1月中旬から盛岡市で警報値(定点あたり患者数8人)を超えた状況が続いています。主症状は発熱や咽頭痛で、肺炎や髄膜炎等、小児では、回復期に糸球体腎炎を併発する場合があります。治療の際は医師の処方に従い抗菌薬を飲みきることが必要です。予防には手洗いやうがいの励行と、患者との濃厚接触を避けることが重要です。
  - ・ 感染性胃腸炎は、中部地区で集団感染事例の報告がありました。予防にはせっけんとう流水による十分な手洗いと、患者の吐物や便の塩素系薬剤を用いた適切な処理が重要です。
  - ・ インフルエンザは減少しましたが、一度かかった人が、その後、別の型にかかることもあるので引き続き注意が必要です。予防にはこまめな手洗いや体調管理、咳エチケットによる感染予防が重要です。
  - ・ 春休みに海外へ渡航される方は、感染症にかからないために正しい知識と予防方法を身に付ける必要があります。厚生労働省検疫所(<https://www.forth.go.jp/index.html>)や外務省海外安全ホームページ(<https://www.anzen.mofa.go.jp/>)等で渡航先の情報を御確認下さい。

## 最近の注目疾患 (定点あたり患者数の過去5週の動き)

(疾患によって目盛りのスケールが違うことに注意)



定点把握対象疾患 (過去5週の動き)

報告週対応表 <http://www.nih.go.jp/niid/ja/calendar.html>

※2018年1月1日より百日咳が5類感染症 (定点把握疾患) から5類感染症 (全数把握疾患) へ変更されました。  
 ※2013年第42週より感染性胃腸炎 (ロタウイルス) が定点把握対象疾患となりました。

(定点あたり患者数)

疾病名	地域	週					流行傾向	
		6	7	8	9	10		
インフルエンザ	岩手県	28	16.77	12.43	9.31	6.8	↘	☆
	全国	26.28	12.49	8.99	5.93	4.12		
RSウイルス感染症	岩手県	0.2	0.33	0.18	0.2	0.1	→	☆
	全国	0.42	0.41	0.44	0.47	0.46		
咽頭結膜熱	岩手県	0.23	0.35	0.25	0.23	0.25	→	☆
	全国	0.33	0.3	0.3	0.33	0.32		
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	岩手県	4.03	3.3	4.95	5.6	6	↗	☆☆
	全国	2.52	2.07	2.67	2.71	2.86		
感染性胃腸炎	岩手県	2.75	4.38	4.85	5.9	5.28	→	☆
	全国	6.03	5.09	5.99	5.95	6.07		
水痘	岩手県	0.18	0.45	0.25	0.68	0.23	→	☆
	全国	0.29	0.26	0.3	0.28	0.33		
手足口病	岩手県	0.5	0.25	0.13	0.18	0.13	→	☆
	全国	0.13	0.1	0.12	0.13	0.14		
伝染性紅斑	岩手県	0.93	0.7	0.5	0.55	0.55	→	☆
	全国	0.57	0.5	0.59	0.57	0.54		
突発性発疹	岩手県	0.58	0.3	0.28	0.45	0.2	→	☆
	全国	0.29	0.28	0.35	0.34	0.36		
ヘルパンギーナ	岩手県	0	0.05	0	0	0	→	
	全国	0.01	0.02	0.01	0.03	0.02		
流行性耳下腺炎	岩手県	0.38	0.18	0.15	0.2	0.25	→	☆
	全国	0.09	0.07	0.09	0.09	0.11		
急性出血性結膜炎	岩手県	0	0	0	0	0	→	
	全国	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01		
流行性角結膜炎	岩手県	1	0.57	0.79	0.21	0.43	→	☆
	全国	0.64	0.54	0.54	0.49	0.44		
細菌性髄膜炎	岩手県	0	0	0.05	0	0	→	
	全国	0.03	0.01	0.02	0.03	0.02		
無菌性髄膜炎	岩手県	0	0	0	0.05	0	→	
	全国	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02		
マイコプラズマ肺炎	岩手県	0.32	0.11	0.21	0.05	0.11	→	☆
	全国	0.18	0.13	0.14	0.2	0.14		
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	岩手県	0	0	0	0	0	→	
	全国	0	0	0	-	0		
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	岩手県	0.21	0.11	0.05	0.16	0.11	→	☆
	全国	0.13	0.13	0.14	0.29	0.28		
インフルエンザ (入院患者) ※報告数であることに注意	岩手県	46	26	15	10	6		
	全国	1,662	930	681	472	363		

【流行傾向の見方】

- 無印 : ほとんど患者が発生していません
- ☆ : 患者が発生しています
- ☆☆ : 警報値を超えた地区が1～2地区あります
- ☆☆☆ : 多くの地区で警報値を超えています

全数把握対象疾患 (過去5週の動き)

※ジカウイルス感染症が2016年2月15日から四類感染症に追加されました。

(患者発生数)

分類	疾病名	(週)					累計	全国	
		6	7	8	9	10		10	累計
一類 感染症	エボラ出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリミア・コンゴ出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	痘そう	0	0	0	0	0	0	0	0
	南米出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	ペスト	0	0	0	0	0	0	0	0
	マールブルグ病	0	0	0	0	0	0	0	0
	ラッサ熱	0	0	0	0	0	0	0	0
二類	急性灰白髄炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	結核 ( ) 内は潜在性結核感染症患者再掲	1 (0)	3 (2)	6 (3)	2 (1)	3 (2)	38 (16)	335	3530
	ジフテリア	0	0	0	0	0	0	0	0
	重症呼吸器症候群	0	0	0	0	0	0	0	0
	中東呼吸器症候群 (MERS)	0	0	0	0	0	0	0	0
	鳥インフルエンザ (H5N1)	0	0	0	0	0	0	0	0
	鳥インフルエンザ (H7N9)	0	0	0	0	0	0	0	0
三類	コレラ	0	0	0	0	0	0	0	0
	細菌性赤痢	0	0	0	0	0	0	5	19
	腸管出血性大腸菌感染症	0	0	0	0	0	1	14	198
	腸チフス	0	0	0	0	0	1	0	6
	パラチフス	0	0	0	0	0	0	1	4
	E型肝炎	0	0	0	0	0	0	11	79
四類 感染症	ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0
	A型肝炎	0	0	0	0	0	3	5	97
	エキノコックス症	0	0	0	0	0	0	0	1
	黄熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	オウム病	0	0	0	0	0	0	0	6
	オムスク出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	回帰熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	キャサナル森林病	0	0	0	0	0	0	0	0
	Q熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	狂犬病	0	0	0	0	0	0	0	0
	コクシジオイデス症	0	0	0	0	0	0	0	1
	サル痘	0	0	0	0	0	0	0	0
	ジカウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)	0	0	0	0	0	0	1	3
	腎症候性出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	西部ウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダニ媒介脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	炭疽	0	0	0	0	0	0	0	0
	チクングニア熱	0	0	0	0	0	0	1	2
	つつが虫病	0	0	0	0	0	0	0	40
	デング熱	0	0	0	0	0	0	8	57
	東部ウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	鳥インフルエンザ (H5N1、H7N9を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0
	ニパウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0	4
	日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	ハンタウイルス肺症候群	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bウイルス病	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼻疽	0	0	0	0	0	0	0	0
	ブルセラ症	0	0	0	0	0	0	0	0
	ベネゼエラウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	ヘンドラウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	発疹チフス	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボツリヌス症	0	0	0	0	0	0	0	0
	マラリア	0	0	0	0	0	0	1	6
	野兔病	0	0	0	0	0	0	0	0
	ライム病	0	0	0	0	0	0	0	0
	リッサウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	リフトバレー熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	類鼻疽	0	0	0	0	0	0	0	0
レジオネラ症	1	0	0	0	0	3	19	260	
レプトスピラ症	0	0	0	0	0	0	0	0	
ロッキー山紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0	0	

全数把握対象疾患 (続き) (過去5週の動き)

(患者発生数)

分類	疾病名	岩手県					全国		
		(週) 6	7	8	9	10	累計 10	累計	
五類感染症	アメーバ赤痢	0	0	0	0	0	0	14	158
	ウイルス性肝炎 (A型肝炎及びE型肝炎を除く)	0	0	0	0	0	0	2	60
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	0	0	0	0	0	0	20	356
	急性弛緩性麻痺	0	0	0	0	0	0	0	12
	急性脳炎 (ウエストナイル脳炎及び日本脳炎を除く)	0	0	0	0	1	4	8	289
	クリプトスポリジウム症	0	0	0	0	0	0	1	1
	クロイツフェルト・ヤコブ病	0	0	0	0	0	0	3	30
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0	0	0	0	0	1	7	192
	後天性免疫不全症候群	0	0	0	0	0	0	8	190
	ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	1	8
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	0	0	0	0	0	0	7	128
	侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	12
	侵襲性肺炎球菌感染症	0	0	0	0	1	3	49	743
	水痘 (入院例)	0	0	0	0	0	0	7	77
	先天性風しん症候群	0	0	0	0	0	0	0	1
	梅毒	0	0	0	0	0	3	88	1132
	播種性クリプトコックス症	0	0	0	0	0	0	3	28
	破傷風	0	0	0	0	0	0	0	8
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	0	0	0	0	2	16
百日咳	0	1	2	0	1	8	259	2989	
風しん	0	0	1	0	0	1	77	860	
麻しん	0	0	0	0	0	1	14	304	
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	0	0	0	0	5	

今注目の感染症



インフルエンザ

インフルエンザは、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症で、毎年世界中で流行がみられます。潜伏期間は1日～3日程で、38℃以上の発熱、頭痛、筋肉痛、関節痛などの症状が突然現れ、鼻水や咳などの呼吸器症状が続きます。

岩手県では、例年、11月下旬から12月上旬頃に発生が始まり、1月から3月頃に患者数が増加します。今シーズンは第50週に定点あたり患者数が1.45人となり、流行開始の目安である1.0人を上回りました。その後増加が続き、第3週には定点あたり患者数が40.03人となり、警報値である30人を超え本格的な流行状態に入りました。第4週には定点あたり患者数が47.11人とピークとなり、第5週以降減少が続いています。一度かかった方が、その後、別の型にかかることもあるので引き続き注意が必要です。

主な感染経路は咳やくしゃみなどによる飛沫感染と、飛沫の付着物に触れた手指などを介した接触感染です。予防には、マスクの着用などの咳エチケットによる飛沫感染対策と、手洗いによる接触感染対策が重要です。また、症状がある場合には早めに医療機関を受診することが勧められます。

参考 インフルエンザとは (国立感染症研究所)  
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/219-about-flu.html>



※国土交通省国土政策局「H29年1月1日時点国土数値情報(行政区域データ)」をもとに岩手県が編集・加工した。  
 ※この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の「数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)」を使用した。(承認番号 平29情使、第675号)

岩手県 第10週

今注目の感染症 (つづき)

風しん

風しんは、風しんウイルスによって引き起こされる、発熱、発疹、リンパ節の腫脹を特徴とする急性の発疹性感染症です。風しんウイルスは、患者の飛沫（唾液のしぶき）などによりヒトからヒトへ感染します。潜伏期間は2週間程度で、発疹が出る前後1週間位がヒトへの感染力があるとされています。風しんに免疫を持たない妊婦の方が妊娠第20週頃までに感染すると、「先天性風しん症候群」という目や心臓、耳などに障害を持つ子供が生まれる可能性があり、妊婦への感染を防止することが重要です。

全国では、2018年第30週以降、関東地方で報告数が大幅に増加し、2018年の累積報告数は2,917人と、全国流行があった2013年（14,344人）に次いで2番目に多い報告数となりました。2019年は第9週までに768例が報告されています。男女別にみますと、男性の報告数が約3.3倍となっており、今回の流行は、風しんの抗体を保有していない30～50代の男性で感染が拡大しているとみられます。

岩手県では、全数把握疾患となった2008年以降、2019年第10週までに23人報告されています。全国流行があった2013年には9人の報告がありました。

予防にはワクチン接種が最も効果的です。2回の定期予防接種（1歳児と小学校入学前1年間）を徹底しましょう。また、2021年度末までの期間に限り、これまで風しんの定期接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性（現在39～56歳）が定期予防接種の対象者として追加されました。また、妊婦への感染を防止するため、予防接種歴や抗体陽性が確認できない「妊婦の夫、子どもや同居家族」、「妊娠希望者や妊娠の可能性が高い女性」の方は、任意で予防接種を受けることが推奨されます。

参考 風疹とは（国立感染症研究所）

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/430-rubella-intro.html>

風疹流行に関する緊急情報：2019年3月6日現在（国立感染症研究所）

<https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/rubella/2019/rubella190306.pdf>

風しんの追加的対策について（厚生労働省）

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/rubella/index\\_00001.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/rubella/index_00001.html)




図1 全国における風しん累積報告数の推移 (2013～2019年第9週) (国立感染症研究所HPより)




図2 全国における年齢別、男女別風しん累積報告数 (2019年第1～9週) (国立感染症研究所HPより)




図3 岩手県における年別・性別風しん報告数 (2008～2019年第10週)

今注目の感染症（つづき）

梅毒

梅毒は、感染力が強い「梅毒トレポネーマ」という、らせん状の細菌によって引き起こされます。主に、感染している人の病変部（性器、口唇部、口腔内、肛門等）と直接接する性行為や疑似性行為により「梅毒トレポネーマ」が粘膜や皮膚などの傷口から侵入して感染します。

感染後3週間程度の潜伏期の後に、感染部位にしこりや潰瘍がみられるようになりますが、数週間程度で症状がなくなります（早期顕症Ⅰ期）。その後、治療をせずに数週間～数カ月経過すると、病原体が血液によって全身に運ばれ、手のひらや足の裏、体全体に発疹がみられるようになります（早期顕症Ⅱ期）。さらに、感染後数年～数十年経過すると、ゴムのような腫瘍、心血管症状、神経症状などが出現する場合があります（晩期顕症）。妊娠している方が梅毒に感染すると、胎盤を通して胎児に感染し、死産、早産、新生児死亡や奇形が起こることがあります。

早期顕症と晩期顕症の間には症状が消える無症候期がありますが、体内には梅毒トレポネーマが残っており、感染を広げる恐れがあります。この無症候期が診断・治療の遅れにつながるため、注意が必要です。また、終生免疫は得られないため、再感染する可能性があります。

全国では、2010年以降、報告数が増加傾向に転じています。男女の異性間性交渉での感染が増加しているほか、性風俗店利用者での梅毒の報告数が増加しています。岩手県では、例年、数例の報告でしたが、2016年に9例、2017年に16例、2018年には29例が報告されました。2019年は第10週までに3例報告されています。

梅毒は早期発見、早期検査、早期治療が重要です。感染が疑われる症状がみられた場合は、早めに医師の診断や治療を受けましょう。また、感染していたことがわかった場合は、周囲で感染の可能性のある方（パートナー等）と一緒に検査を行い、必要に応じて治療を行うことが重要です。

岩手県では、県内各保健所において、匿名、無料で梅毒検査を行っています。他の性感染症も含め、適切な予防対策を取り、症状がみられるなど不安がある場合には、検査や医療機関を受診するよう心がけましょう。

参考 IASR 2015年2月号（国立感染症研究所）

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/id/742-disease-based/ha/syphilis/idsc/iasr-topic/5404-tpc420-j.html>




図1 全国における梅毒患者届出数の推移（2006年～2018年）




図2 岩手県における梅毒患者届出数の推移（2006年～2019年第10週）

今注目の感染症 (つづき)

麻疹

麻疹は、麻疹ウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症です。感染経路は空気感染、飛沫感染、接触感染で、感染力は非常に強く、免疫を持っていない人が感染するとほぼ100%発症するといわれています。

症状としては、感染から約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れ、2～3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。また、ヒトの体内に入った麻疹ウイルスは一時的に免疫機能を抑制するため肺炎や中耳炎などの合併症をおこしやすく、患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症するといわれています。

全国では、2008年に10～20歳を中心に流行し、11,013例の報告がありました。2009年以降は35～732例で推移しています。2018年の累積報告数は282例でした。2019年は、第2週以降急増しており、第9週までに285例が報告されています。

岩手県では2012年第12週以降届出がありませんでしたが、2019年第4週に1例報告がありました。2008年に全数把握疾患に変更になってから、2019年第10週までに23例が報告されています。

予防にはワクチン接種が最も有効です。定期予防接種は、1歳児と小学校入学前1年間の幼児の2回です。自分が感染しないためだけでなく、周囲の人に感染させないためにも予防接種を受けることが勧められます。また、海外では、麻疹が多く発生している地域がいまだに多くあります。海外旅行を予定されている方は、ワクチン接種歴等を確認の上、必要に応じてワクチン接種を行うことが推奨されます。帰国後は麻疹を発症する可能性も考慮して、2週間程度は健康状態に注意することも重要です。

また、麻疹を疑う症状があり、医療機関を受診する場合は、感染拡大を防止するため、事前に医療機関に連絡してから受診することが重要です。

参考

麻疹について (厚生労働省)

[http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/measles/index.html](http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/measles/index.html)

麻疹とは (国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ma/measles.html>

IDWR 2019年第7号 注目すべき感染症 麻疹 (国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/measles-m/measles-idwrc.html>




図1 全国における麻疹累積報告数の推移 (2013～2019年第9週) (国立感染症研究所HP)




図2 岩手県における年別麻疹報告数 (2008～2019年第10週)

## 病原体検出情報

- ・インフルエンザの患者の咽頭ぬぐい液から、インフルエンザウイルスAH1pdm09を8件、インフルエンザウイルスAH3を8件、それぞれ検出しました。

## 集団感染情報

- 感染性胃腸炎の集団発生について
  - ・花巻市内の幼稚園（園児102名、職員15名）  
2月27日（水）から3月11日（月）にかけて、園児20名に症状（嘔吐、下痢等）  
有症者3名からロタウイルス、有症者1名からノロウイルスを検出
- インフルエンザによる学校等の休業措置について（3月6日から3月13日発表分）
  - ・岩手県 6件
  - ・盛岡市 1件

詳細は岩手県医療政策室のホームページを御覧ください。  
<http://www.pref.iwate.jp/iryuu/kenkou/Influ/69113/index.html>

## 医療機関からの情報

- ・この週には医療機関からの情報はありません。







## Q & A






読者の皆様からのご質問にはこの欄でお答えします。







医療機関からの情報や読者の皆様からのご質問は下記の宛先までお寄せください。  
岩手県感染症情報センター（岩手県環境保健研究センター保健科学部内）  
〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡1-11-16  
TEL:019-656-5669（直通） FAX:019-656-5667  
E-mail: CC0019@pref.iwate.jp



疾病別グラフ (定点あたり患者数の推移)







定点医療機関の数

地区	定点種別	インフル エンザ	小児科定 点	眼科定点	基幹定点
岩手県		65	40	14	19
盛岡市		11	7	3	5
県央		8	5	2	0
中部		12	7	2	4
奥州		7	4	1	2
一関		7	4	1	2
大船渡		6	4	1	1
釜石		3	2	1	1
宮古		5	3	1	1
久慈		3	2	1	1
二戸		3	2	1	2



無料です!!

岩手の感染症情報を毎週メールでお届けする

「岩手県感染症情報ウィークリーマガジン」を配信しています。

配信の登録は以下のURLからお願いします。

<http://www2.pref.iwate.jp/~hp1353/kansen/mailmagazine.html>

岩手県感染症週報 平成31年第10週 平成31年3月15日発行

監修：岩手県感染症発生動向調査委員会

発行：岩手県環境保健研究センター  
岩手県保健福祉部医療政策室

事務局：岩手県感染症情報センター  
(岩手県環境保健研究センター保健科学部内)

〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡1-11-16

TEL:019-656-5669 (直通) FAX:019-656-5667

E-mail: CC0019@pref.iwate.jp

URL: <http://www2.pref.iwate.jp/~hp1353/kansen/>

<岩手県感染症情報センター>

<http://www.pref.iwate.jp/iryuu/kenkou/index.html>

<岩手県保健福祉部医療政策室>