

岩手県感染症週報

平成25年第20週(5月13日～5月19日)


岩手県感染症情報センター

第20週の概要

- 1 類感染症 ・患者発生の報告はありませんでした。
- 2 類感染症 ・患者発生の報告はありませんでした。
- 3 類感染症 ・患者発生の報告はありませんでした。
- 4 類感染症 ・つつが虫病は、県央地区から今年初めての報告がありました。本疾患は、野外活動中に感染することから、農作業や、山菜採りの際には肌の露出を少なくし、帰宅後には速やかに入浴やシャワーなどで体表を洗い流すことが大切です。また、野外活動後に発熱、発疹、頭痛といった症状があり感染が疑われた場合には、早期の受診が勧められます。
- 5 類感染症 (全数把握対象疾患)
 - ・風しんは、県内で今年4例目となる報告がありました。予防接種歴のない30歳代の男性でした。全国では、首都圏、関西を中心に急増しており、今年これまでの患者は、30歳代の男性が多く、約3割を占めています。潜伏期間は2～3週間で、主な症状は発疹、発熱、リンパ節の腫れです。予防には、ワクチン接種が有効です。
 - ・梅毒の患者の報告がありました。患者は30歳代の男性です。
- 5 類感染症 (定点把握対象疾患)
 - ・インフルエンザは、久慈地区で流行が続いています。同地区の患者の年齢層は、10～14歳が多く、学校等閉鎖措置の報告もされています。予防には、手洗い、咳エチケットが重要です。

最近の注目疾患 (定点あたり患者数の過去5週の動き)

(疾患によって目盛りのスケールが違うことに注意)



定点把握対象疾患 (過去5週の動き)

(定点あたり患者数)

疾病名	地域	週					流行傾向	
		16	17	18	19	20		
インフルエンザ	岩手県	3.2	3.36	2.28	1.25	1.7	→	☆
	全国	2.89	3.07	2.36	1.91	1.87		
RSウイルス感染症	岩手県	0.08	0.03	0.05	0	0	→	
	全国	0.17	0.17	0.12	0.12	0.11		
咽頭結膜熱	岩手県	0.18	0.15	0.25	0.3	0.4	→	☆
	全国	0.35	0.4	0.3	0.47	0.49		
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	岩手県	2.1	1.48	1.3	2.18	1.88	→	☆
	全国	2.1	2.19	1.39	1.88	2.38		
感染性胃腸炎	岩手県	7.3	7.28	5.48	6.88	6.55	→	☆
	全国	8.1	8.84	5.99	8.04	8.65		
水痘	岩手県	0.75	2.05	0.95	1.95	1.23	→	☆☆
	全国	1.01	1.14	0.93	1.55	1.38		
手足口病	岩手県	0	0.03	0.08	0	0	→	
	全国	0.3	0.36	0.32	0.38	0.5		
伝染性紅斑	岩手県	0.38	0.2	0.13	0.38	0.25	→	☆
	全国	0.09	0.07	0.05	0.08	0.08		
突発性発疹	岩手県	0.48	0.55	0.43	0.4	0.58	→	☆
	全国	0.61	0.64	0.4	0.61	0.63		
百日咳	岩手県	0	0	0	0	0.03	→	
	全国	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
ヘルパンギーナ	岩手県	0	0	0	0.03	0	→	
	全国	0.05	0.06	0.05	0.07	0.11		
流行性耳下腺炎	岩手県	1	0.43	0.4	0.9	0.43	→	☆
	全国	0.25	0.24	0.19	0.26	0.3		
急性出血性結膜炎	岩手県	0	0	0	0	0	→	
	全国	0.01	0.02	0.02	0.05	0.03		
流行性角結膜炎	岩手県	0.29	0.36	0.21	0.57	0.64	→	☆
	全国	0.59	0.57	0.42	0.65	0.65		
細菌性髄膜炎	岩手県	0	0	0	0	0	→	
	全国	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02		
無菌性髄膜炎	岩手県	0.05	0	0	0	0	→	
	全国	0.02	0.05	0.02	0.03	0.02		
マイコプラズマ肺炎	岩手県	0.84	1	0.95	1.26	1.47	→	☆
	全国	0.52	0.53	0.47	0.45	0.49		
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	岩手県	0	0	0	0	0	→	
	全国	0.04	0.04	0.02	0.06	0.04		

【流行傾向の見方】

- 無印 : ほとんど患者が発生していません
- ☆ : 患者が発生しています
- ☆☆ : 警報値を超えた地区が1～2地区あります
- ☆☆☆ : 多くの地区で警報値を超えています

全数把握対象疾患 (過去5週の動き)

※重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) が
10週より対象疾患になりました。

(患者発生数)

	疾病名	(週) 岩手県					全国		
		16	17	18	19	20	累計	20	累計
一類 感染症	エボラ出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	クリミア・コンゴ出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	痘そう	0	0	0	0	0	0	0	0
	南米出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	ペスト	0	0	0	0	0	0	0	0
	マールブルグ病	0	0	0	0	0	0	0	0
	ラッサ熱	0	0	0	0	0	0	0	0
二類	急性灰白髄炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	結核 () 内は潜在性結核感染症患者数	1 (1)	6 (0)	6 (2)	5 (1)	0	75 (29)	314	9204
	ジフテリア	0	0	0	0	0	0	0	0
	重症呼吸器症候群	0	0	0	0	0	0	0	0
	鳥インフルエンザ (H5N1)	0	0	0	0	0	0	0	0
三類	コレラ	0	0	0	0	0	0	1	1
	細菌性赤痢	0	0	0	0	0	0	3	46
	腸管出血性大腸菌感染症	0	0	1	0	0	4	33	285
	腸チフス	0	0	0	0	0	0	0	26
	パラチフス	0	0	0	0	0	0	0	24
四類 感染症	E型肝炎	0	0	0	0	0	0	1	49
	ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0
	A型肝炎	0	0	0	0	0	0	2	61
	エキノкокクス症	0	0	0	0	0	0	0	7
	黄熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	オウム病	0	0	0	0	0	0	0	4
	オムスク出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	回帰熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	キャサヌル森林病	0	0	0	0	0	0	0	0
	Q熱	0	0	0	0	0	0	1	2
	狂犬病	0	0	0	0	0	0	0	0
	コクシジオイデス症	0	0	0	0	0	0	0	2
	サル痘	0	0	0	0	0	0	0	0
	重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)	0	0	0	0	0	0	2	12
	腎症候性出血熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	西部ウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダニ媒介脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	炭疽	0	0	0	0	0	0	0	0
	チクングニア熱	0	0	0	0	0	0	0	6
	つつが虫病	0	0	0	0	1	1	7	53
	デング熱	0	0	0	0	0	0	7	62
	東部ウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	鳥インフルエンザ (H5N1、H7N9を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0
	ニパウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	日本紅斑熱	0	0	0	0	0	0	1	5
	日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	ハンタウイルス肺症候群	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bウイルス病	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼻疽	0	0	0	0	0	0	0	0
	ブルセラ症	0	0	0	0	0	0	0	1
	ベネゼエラウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
	ヘンドラウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	発疹チフス	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボツリヌス症	0	0	0	0	0	0	0	0
	マラリア	0	0	0	0	0	0	2	17
	野兔病	0	0	0	0	0	0	0	0
	ライム病	0	0	0	0	0	0	0	1
	リッサウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	リフトバレー熱	0	0	0	0	0	0	0	0
	類鼻疽	0	0	0	0	0	0	0	2
レジオネラ症	0	0	0	0	0	1	12	248	
レプトスピラ症	0	0	0	0	0	0	0	3	
ロッキー山紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0	0	

全数把握対象疾患 (続き) (過去5週の動き)

(患者発生数)

※侵襲性インフルエンザ感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症が第14週より、鳥インフルエンザ (H7N9) は1第19週より対象疾患となりました。

分類	疾病名	岩手県					全国		
		(週) 16	17	18	19	20	累計	20	累計
五類感染症	アメーバ赤痢	0	0	0	0	0	1	5	358
	ウイルス性肝炎 (A型肝炎及びE型肝炎を除く)	0	0	0	0	0	0	3	95
	急性脳炎 (ウエストナイル脳炎及び日本脳炎を除く)	0	0	0	0	0	3	3	168
	クリプトスポリジウム症	0	0	0	0	0	0	0	1
	クロイツフェルト・ヤコブ病	0	0	0	0	0	0	2	66
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0	0	0	0	0	1	2	80
	後天性免疫不全症候群	0	0	0	0	0	1	14	512
	ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	1	29
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	0	0	0	0	0	0	1	18
	侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	0	0	0	0	1	6
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	0	0	0	0	1	32	240
	先天性風しん症候群	0	0	0	0	0	0	0	5
	梅毒	0	0	0	0	1	1	21	389
	破傷風	0	0	0	0	0	1	5	38
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	26
	風しん	1	0	0	1	1	4	571	7540
麻しん	0	0	0	0	0	0	9	133	
新	鳥インフルエンザ (H7N9)			0	0	0	0	0	0

今注目の感染症

つつが虫病

つつが虫病は、ツツガムシ病リケッチアに感染したツツガムシ (ダニの一種) の幼虫の刺咬により感染します。

ツツガムシの生息しているような場所 (野山や田畑、河川敷等) に立ち入る場合は、肌の露出を少なくして防虫剤 (ある程度効果が見込める) を適宜使用しましょう。帰宅後は速やかに入浴やシャワーなどで、ダニを洗い流すことも大切です。

潜伏期間は5日から15日間で、症状は発熱、刺し口、発疹が主要症状です。

つつが虫病は適切な治療を早期に受けることが重要です。野外での活動の後、疑わしい症状がでた場合には、早めに医療機関を受診しましょう。野外での活動のことを医師に伝えることも大切です。





図1. ツツガムシの生活環

国立感染症研究所ホームページ



今注目の感染症 (つづき)

重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)

重症熱性血小板減少症候群 (severe fever with thrombocytopenia Syndrome: SFTS) は、SFTSウイルスによるダニ媒介性感染症です。人への感染は、SFTSウイルスを有するダニに咬まれることによりますが、他に患者血液や体液との直接接触による感染も報告されています。

潜伏期は、6日～2週間で、発熱、消化器症状 (食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛)、頭痛、筋肉痛、神経症状 (意識障害、けいれん、昏睡)、リンパ節腫脹、呼吸器症状 (咳、咽頭痛)、出血症状 (紫斑、下血) 等の症状が出現します。


SFTSは、中国で2011年に新規感染性疾患として報告されており、中国ではフタトゲチマダニ、オウシマダニからSFTSウイルスが分離されています。

フタトゲチマダニ、オウシマダニは日本にも生息しており、ダニの活動が活発化するのは春から秋ですので、これからの時期、ダニに咬まれないような対策をとることが必要です。

ダニの居そうな草むらや藪などに入る場合は、ダニに咬まれないよう、長袖の服、長ズボン、足を完全に覆う靴を履き、肌の露出を少なくすることが重要です。

重症熱性血小板減少症候群に関するQ&A (厚生労働省ホームページ)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/sfts_qa.html



フタトゲチマダニ
(写真：国立感染症研究所昆虫医科学部)

ダニを媒介して起こる代表的な感染症

疾患名	媒介するダニ	病原体	症状	潜伏期	発生状況(2011年)	
					全国	岩手県
重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)	マダニ (フタトゲチマダニ、オウシマダニ)	<i>SFTS virus (severe fever with thrombocytopenia syndrome virus)</i>	発熱、消化器症状 (嘔吐、下痢等)、頭痛、血小板減少 (10万/mm ³ 未満)	6日～14日	※ —	—
つつが虫病	ツツガムシ (アカツツガムシ、タテツツガムシ、フトゲツツガムシ)	<i>Orientia tsutsugamushi</i>	全身倦怠感、食欲不振、頭痛、悪寒、発熱、リンパ節腫脹、発疹	5日～15日	462	10
日本紅斑熱	マダニ (キチマダニ、フタトゲチマダニ、ヤマトマダニ等)	<i>Rickettsia japonica</i>	頭痛、全身倦怠感、高熱、紅色の斑丘疹	2日～8日	190	0
ライム病	マダニ (シュルツェマダニ)	<i>Borrelia garinii</i> <i>Borrelia afzelii</i>	遊走性紅斑、インフルエンザ様症状 (倦怠感、頭痛、発熱など)	数日～数週間	9	0

※日本での5月18日までの感染者は15名(死亡8名)(新聞報道情報)

今注目の感染症 (つづき)

風しん

風しんは、風しんウイルスによっておこる、発熱、発疹、リンパ節腫脹を特徴とするウイルス性発疹症です。風しんウイルスは患者の飛沫（唾液のしぶき）などによって他の人にうつります。発疹のでる2～3日前から発疹がでた5日くらいまでの患者は感染力があると考えられています。


風しんの予防にはワクチン接種が有効です。定期予防接種の対象者（1歳、年度内に6歳になる方）は年度内に接種しましょう。

免疫のない女性が妊娠初期に風しんに罹患すると、風しんウイルスが胎児に感染して、出生児に先天性風疹症候群（CRS）と総称される障がいを引き起こすことがあります。妊娠を希望する女性や、その家族などの成人も、風しんの罹患歴や予防接種歴がない、または不明な場合には積極的に風しんワクチン接種を受けることが勧められます。


平成25年の全国の風しんの報告は、5月15日までに6,725人となり、過去5年間で最も多い報告数となりました。首都圏や関西で報告数が急増しています。

参考 国立感染症研究所 感染症疫学センター「風疹」
<http://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ha/rubella.html>

1. 風しん累積報告数の推移2009～2013年 (第1～19週)
 Cumulative number of rubella cases by week, 2009-2013 (week1-19)
 (based on diagnosed week as of May 15, 2013).



4. 都道府県別病型別風しん累積報告数 2013年 第1～19週 (n=6,725)
 Cumulative rubella cases by prefecture and methods of diagnosis from week 1 to week 19, 2013
 (as of May 15, 2013).



国立感染症研究所 感染症疫学センター

今注目の感染症 (つづき)

風しんワクチン接種状況 (年齢別)

年齢	2000	2001	2002	2003	2004	2005
0歳児						
1歳児						
2歳児						
3歳児						
4歳児						
5歳児						
6歳児						
7歳児						
8歳児						
9歳児						
10歳児						
11歳児						
12歳児						
13歳児						
14歳児						
15歳児						
16歳児						
17歳児						
18歳児						
19歳児						
20歳児						
21歳児						
22歳児						
23歳児						
24歳児						
25歳児						
26歳児						
27歳児						
28歳児						
29歳児						
30歳児						
31歳児						
32歳児						
33歳児						
34歳児						
35歳児						
36歳児						
37歳児						
38歳児						
39歳児						
40歳児						
41歳児						
42歳児						
43歳児						
44歳児						
45歳児						
46歳児						
47歳児						
48歳児						
49歳児						
50歳児						
51歳児						
52歳児						
53歳児						
54歳児						
55歳児						
56歳児						
57歳児						
58歳児						
59歳児						
60歳児						
61歳児						
62歳児						
63歳児						
64歳児						
65歳児						
66歳児						
67歳児						
68歳児						
69歳児						
70歳児						
71歳児						
72歳児						
73歳児						
74歳児						
75歳児						
76歳児						
77歳児						
78歳児						
79歳児						
80歳児						
81歳児						
82歳児						
83歳児						
84歳児						
85歳児						
86歳児						
87歳児						
88歳児						
89歳児						
90歳児						

風しんの予防接種は、1977年8月に女子中学生を対象に始めました①。
 1995年から乳児を対象に医療機関での個別接種となりました。時限的に男女中学生も対象となりました②が、接種率が激減しました。
 2006年から、1歳と小学校入学前1年間の幼児に対する2回接種が始まりました。また、2008-2012年度の5年間に限り、中学1年生、高校3年生相当年齢の方に2回目の接種ができるよう時限措置を実施しました。④⑤


詳細は国立感染症研究所病原微生物検出状況IASR4月号
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/rubella-m-111/rubella-iasrtpc/3459-tpc398-j.html>

岩手県の風しんの発生状況

岩手県内における風しんの届出状況(平成20年1月～平成25年5月)

診断日	保健所	性別	年齢	備考
平成25年5月23日	釜石	男	28	検査診断例
平成25年5月23日	奥州	男	13	臨床診断例
平成25年5月18日	宮古	男	32	検査診断例
平成25年5月7日	宮古	男	62	検査診断例
平成25年4月15日	県央	男	2	臨床診断例
平成25年2月8日	中部	男	19	検査診断例
平成24年8月9日	奥州	男	14	臨床診断例
平成23年3月23日	盛岡市	男	21	検査診断例
平成22年12月27日	一関	男	5	臨床診断例
平成20年12月26日	奥州	男	34	検査診断例
平成20年6月17日	中部	男	6	臨床診断例

岩手県の風しんの発生状況ですが、1997年の流行以降、次第に発生数は少なくなりました。
 平成20年(2008年)に定点把握疾患から全数把握疾患に変更になってから平成25年5月まで、10例の届出がありました。



病原体検出情報

○この週には病原体検出情報はありません

集団感染情報

○感染性胃腸炎の集団発生について (5月21日、22日)

- ・盛岡市内の保育園 (園児125名、職員27名)
5月7日 (火) から5月21日 (火) までに園児23名に症状 (嘔吐、下痢、発熱等)
有症者4名中4名 (園児4名) からロタウイルスを確認
- ・盛岡市内の児童養護施設 (入所者67名、職員43名)
5月4日 (土) から5月22日 (水) までに入所者15名に症状 (嘔吐、下痢、発熱等)
有症者7名中5名 (入所者5名) からノロウイルスを確認

○インフルエンザによる学校等の休業措置について (5月16日～5月21日)

- ・岩手県発表 4件

詳細は、岩手県医療政策室のホームページをご覧ください。

<http://www.pref.iwate.jp/list.rbz?nd=4104&ik=1&pnp=3324&pnp=4104>

医療機関からの情報

- ・この週には医療機関からの情報はありません。

Q & A

読者の皆様からのご質問にはこの欄でお答えします。

医療機関からの情報や読者の皆様からのご質問は下記の宛先までお寄せください。

岩手県感染症情報センター (岩手県環境保健研究センター保健科学部内)







〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡1-11-16







(平成24年2月20日より住居表示が変更となりました。)







TEL:019-656-5669 (直通) FAX:019-656-5667

E-mail: CC0019@pref.iwate.jp

疾病別グラフ (定点あたり患者数の推移)








定点医療機関の数

地区	定点種別 インフル エンザ	小児科定 点	眼科定点	基幹定点
岩手県	64	40	13	19
盛岡市	11	7	3	5
県央	7	5	2	0
中部	12	7	1	4
奥州	7	4	1	2
一関	7	4	1	2
大船渡	6	4	1	1
釜石	3	2	1	1
宮古	5	3	1	1
久慈	3	2	1	1
二戸	3	2	1	2



無料です!!

岩手の感染症情報を毎週メールでお届けする

「岩手県感染症情報ウィークリーマガジン」を配信しています。

配信の登録は以下のURLからお願いします。

<http://www.pref.iwate.jp/~hp1353/kansen/mailmagazine.html>

岩手県感染症週報 平成25年第20週 平成25年5月24日発行

監修：岩手県感染症発生動向調査委員会

発行：岩手県環境保健研究センター
岩手県保健福祉部医療政策室

事務局：岩手県感染症情報センター
(岩手県環境保健研究センター保健科学部内)

〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡1-11-16

(平成24年2月20日より住居表示が変更となりました。)

TEL:019-656-5669 (直通) FAX:019-656-5667

E-mail: CC0019@pref.iwate.jp

URL: <http://www.pref.iwate.jp/~hp1353/kansen/>

<岩手県感染症情報センター>

<http://www.pref.iwate.jp/info.rbz?nd=345&ik=3&pnp=17&pnp=60&pnp=345>

<岩手県保健福祉部医療政策室>